# Pendant la désinfection

Cette pièce est désinfectée par aérosol grâce à un procédé automatisé qui génère un brouillard désinfectant

Pendant la désinfection, l'air ambiant contient une forte concentration en peroxyde d'hydrogène ($H_2O_2$), qui peut être nocive pour les yeux et les voies respiratoires. *

Il est interdit d'ouvrir la pièce ou d'y entrer avant la fin du programme de désinfection!*

Ne mettez pas en marche le système de ventilation.

# Après désinfection

Le moment à partir duquel il est possible de pénétrer dans la pièce ou de remettre en service la ventilation est noté sur la porte / le panneau.

Le temps de contact minimal et la durée de résorption du brouillard désinfectant sont d'au moins 2h après la fin du processus de nébulisation.

Il est ensuite possible, selon les cas, d'aérer la pièce ou d'attendre la résorption* du brouillard désinfectant jusqu'à un niveau non dangereux.

*En ce qui concerne le peroxyde d'hydrogène ($H_2O_2$) présent dans l'air ambiant, la limite maximale pour entrer sans masque de protection respiratoire (classe de protection ABEK P3) dans une pièce après désinfection est de 1 ppm.

SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

**SANOSIL AG** • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland
E-mail: service@sanosil.com
www.sanosil.com